




用藥安全






李伯綦 老師






● 不喜歡醫生要求的吃藥
方法，我可以自己改變
方法







1



- 不喜歡醫生要求的吃藥方法，也不可以自己改變方法
 - 請用醫生 護士教的方法吃藥
- 




● 我覺得醫生要我吃的藥
太多了，我就自己減少
一些




● 我覺得醫生要我吃的藥
太少了，我就自己多吃
一些








2

- 不能自己改變藥的多或少
 - 有問題可以隨時問醫生
- 



● 如果不會吞藥丸，要先
告訴醫生






● 看病的時候要告訴醫生
平常在吃的藥






3

- 有癲癇 心臟病 都要先告訴醫生
- 如果吃藥會過敏 也要先讓醫生知道
- 要讓醫生知道自己正在使用的藥






● 不一樣的藥可以放在同一個瓶子裡面







● 上次感冒的藥還剩下很多，可以留到下次感冒的時候吃





● 上次感冒的藥還剩下很多，可以分給其他朋友吃







4

- 每次生病領的藥都要按時吃完
 - 不能把自己的藥給別人吃
- 



● 藥很苦，所以吃藥的時候要配果汁



5

● 吃藥只能配白開水  0

● 吃藥不能配汽水 果汁 咖啡 茶



X



X


X

X




● 電視上介紹的藥看起來
很棒，要趕快去買





● 多吃維他命，身體才會
越來越健康



吃藥以前

- 檢查藥袋

- 問清楚吃藥的方法



檢查藥袋

基本資料

姓名

性別

年齡



行政院 國軍退除役官兵輔導委員會 台北榮民總醫院
Taipei Veterans General Hospital, VAC, Executive Yuan

領藥號: 6-1395
Prescription No.

健保

重印: PH7819SJ A
藥袋數: 04 - 03
Bag No.

姓名: 林吳 女 F 079 歲 病歷號: 3228
Patient Name Gender Age History No.

用法用量: 口服 每日1次 (餐後立即使用) 每次1 粒
Administration Oral 1 time a day with meal (same time every day)
Dosage 1 tablet(s) each time

藥名: 樂泄錠 40毫克 (弗西邁)
Drug Name Rosin tab 40 mg VPP (Furosemide, Lasix)

外觀標記: 淡紅、圓形、324
Appearance Pink, round, 324, tablet
廠牌: 榮民製藥 VPP 發藥量: 28 粒 tablet(s)
Manufacturer Quantity

臨床用途: 利尿、改善水腫、降血壓
Clinical Uses Diuresis, edema improvement, and anti-hypertension

用藥需知: 與食物併服 (進食後立即服藥)。本藥可增加排尿, 所以應選擇在白天服藥 (最好在早上)。避免高鹽飲食。曾對陽光過敏者外出應防曬。

Other Instructions: Take immediately after food. May increase urine output; suggest to take at daytime (best in the morning). Avoid high sodium diet. History of photosensitive patients should wear sun protection when at outdoor.

處方醫師: 盧 LU, T. M.
Physician
就診科別: 心臟內科下午 103
Division Cardiology
日期時間: 2005/08/22 1452
Date & Time

處方天數: 28 天 day(s)
Duration
調劑藥師: 藥師何沁沁 藥師周月卿
Pharmacist-1 藥字第023382號 藥字第09448號
核對藥師: PS10
Pharmacist-2

請核對姓名、藥袋總數、藥品名稱與外觀及數量; 並注意效期, 未標示者為一個月
Please verify patient name, total bag number, drug name, appearance, and quantity.
The expiration date is one month unless labeled on the package. 新型專利第M248448號

檢查藥袋

服藥方法

用藥方式

藥量



行政院 國軍退除役官兵 台北榮民總醫院
輔導委員會
Taipei Veterans General Hospital, VAC, Executive Yuan

領藥號：6-1395
Prescription No.

健保

重印：PH7819SJ A
藥袋數：04 - 03
Bag No.

姓名：林吳 女 F 079 歲 病歷號：3228
Patient Name Gender Age History No.

用法用量：口服 每日1次（餐後立即使用） 每次1 粒
Administration Oral
Dosage Once a day with meal (same time every day)
1 tablet(s) each time

藥名：樂世錠 40毫克（弗西邁）
Drug Name Rosis tab 40 mg VPP (Furosemide, Lasix)

外觀標記：淺紅、圓形、324
Appearance Pink, round, 324, tablet

廠牌：榮民製藥 VPP 發藥量：28 粒 tablet(s)
Manufacturer Quantity

臨床用途：利尿、改善水腫、降血壓
Clinical Uses Diuresis, edema improvement, and anti-hypertension

用藥需知：與食物併服（進食後立即服藥）。本藥可增加排尿，所以應選擇在白天服藥（最好在早上）。避免高鹽飲食。曾對陽光過敏者外出應防曬。

Other Instructions: Take immediately after food. May increase urine output; suggest to take at daytime (best in the morning). Avoid high sodium diet. History of photosensitive patients should wear sun protection when at outdoor.

處方醫師：盧 LU, T. M.
就診科別：心臟內科下午 103
Division Cardiology
日期時間：2005/08/22 1452
Date & Time

處方天數：28 天 day(s)
Duration

調劑藥師：藥師何沁沁 藥師周月卿
Pharmacist-1 藥字第023382號 藥字第09448號
核對藥師：PS10
Pharmacist-2

請核對姓名、藥袋總數、藥品名稱與外觀及數量；並注意效期，未標示者為一個月
Please verify patient name, total bag number, drug name, appearance, and quantity.
The expiration date is one month unless labeled on the package. 新型專利第M248448號

檢查藥袋

注意事項



行政院 國軍退除役官兵輔導委員會 台北榮民總醫院
Taipei Veterans General Hospital, VAC, Executive Yuan

領藥號: 6-1395
Prescription No.

健保

重印: PH7819SJ A
藥袋數: 04 - 03
Bag No.

姓名: 林吳 女 F 079 歲 病歷號: 3228
Patient Name Gender Age History No.

用法用量: 口服 每日1次(餐後立即使用) 每次1 粒
Administration Oral
Dosage Once a day with meal (same time every day)
1 tablet(s) each time

藥名: 樂泄錠 40毫克(弗西邁)
Drug Name Rosis tab 40 mg VPP (Furosemide, Lasix)

外觀標記: 淺紅、圓形、324
Appearance Pink, round, 324, tablet

廠牌: 榮民製藥 VPP 發藥量: 28 粒 tablet(s)
Manufacturer Quantity

臨床用途: 利尿、改善水腫、降血壓
Clinical Uses Diuresis, edema improvement, and anti-hypertension

用藥需知: 與食物併服(進食後立即服藥)。本藥可增加排尿,所以應選擇在白天服藥(最好在早上)。避免高鹽飲食。曾對陽光過敏者外出應防曬。

Other Instructions: Take immediately after food. May increase urine output; suggest to take at daytime (best in the morning). Avoid high sodium diet. History of photosensitive patients should wear sun protection when at outdoor.

處方醫師: 盧 LU, T. M.

就診科別: 心臟內科下午 103
Division Cardiology

日期時間: 2005/08/22 1452
Date & Time

處方天數: 28 天 day(s)
Duration

調劑藥師: 藥師何沁沁 藥師周月卿
Pharmacist-1 藥字第023382號 藥字第09448號

核對藥師: PS10
Pharmacist-2

請核對姓名、藥袋總數、藥品名稱與外觀及數量;並注意效期,未標示者為一個月
Please verify patient name, total bag number, drug name, appearance, and quantity.
The expiration date is one month unless labeled on the package. 新型專利第M248448號

藥袋

● 姓名

● 用藥方式

| 藥局 | |
|--|--|
| 先生 女士 | |
| 每日 <u>2</u> 次 <u>7</u> 日份 | |
| 內服藥 | <input type="checkbox"/> 三餐飯後及睡前服用1包(粒) |
| | <input type="checkbox"/> 每隔 _____ 小時服用1包(粒) |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 早晚各服用1包(粒) |
| | <input type="checkbox"/> 紅包：退燒藥38.5°C以上 |
| | <input type="checkbox"/> 綠包：腹瀉時服用 |
| <input type="checkbox"/> 藥水每次 _____ c.c. | |
| 外用 | <input type="checkbox"/> 藥膏每日塗 _____ 次 |
| | <input type="checkbox"/> 藥水每日塗、點 _____ 次 |
| | <input type="checkbox"/> 塞劑：必要時塞 _____ 顆 |
| 警語： | <input type="checkbox"/> 服用後不宜開車或操作機械。 |
| | <input type="checkbox"/> 服藥期間請勿與葡萄柚併用。 |
| 地址： | |
| 電話： | |
| 中華民國 <u>92</u> 年 <u>8</u> 月 <u>30</u> 日 | |
| 高醫藥製07(295)2832 | |

藥袋

姓名

用藥方式

行政院 國軍退除役官兵 桃園榮民醫院
輔導委員會

Tao Yuan Veterans Hospital, VAC, Executive Yuan

領藥後，請立刻核對藥袋上之姓名，當面點清藥品種類及數量。

After taking medicine, please verify patient name, total bag number, drug name, and quantity.

領藥號碼： 26

領藥日期：

看診日期：

病歷號： 99999

年 齡： 23 歲

姓 名： 王小真 小姐

性 別： 女

就診科別： 0002 內科急診

處方醫師：

藥品名稱： Rosis 40mg TAB

編 號： 2 號

藥品學名： Furosemide 40mg TAB

藥品中文名稱： 樂瀉

用 法： 口服 每日早上(飯後)一次

每 次： 1 顆 共 3 日份

臨床用途： 利尿、高血壓

用藥須知： 1.宜白天服用 2.對磺胺類藥物過敏者,可能產生過敏

藥品特徵： 粉紅色圓錠有324字樣

調劑藥師： 1

核對藥師：

發藥藥師：

列印時間：

藥袋



行政院 國軍退除役官兵輔導委員會 台北榮民總醫院
 Taipei Veterans General Hospital, VAC, Executive Yuan

領藥號: 60372
 Prescription No.

健保

藥袋數: 07 - 01
 Bag No.

姓名: 黃○○
 Patient Name

男 M
 Gender

076 歲
 Age

病歷號: 1234567-8
 History No.

用法用量: 口服
 每日1次 (餐後立即使用) 每次1
 Administration Oral
 Once a day with meal (same time every day)
 Dosage 1 tablet(s) each time

中英藥袋
 正面

藥名: 樂泄錠 40毫克 (弗西邁)
 Drug Name ROSIS TAB 40MG VPP (Furosemide, Lasix)

外觀標記: 淺紅、圓形、324
 Appearance Pink, round, 324, tablet
 廠牌: 榮民製藥 VPP
 Manufacturer

發藥量: 30 粒
 Quantity tablet(s)

臨床用途: 利尿、改善水腫、降血壓
 Clinical Uses Diuresis, edema improvement, and anti-hypertension

用藥需知: 與食物併服 (進食後立即服藥)。本藥可增加排尿, 所以應選擇在白天服藥 (最好在早上), 避免高鹽飲食, 曾對陽光過敏者外出應防曬

Other Instructions: Take immediately after food. May increase urine output; suggest to take at daytime (best in the morning). Avoid high sodium diet. History of photosensitive patients should wear sun protection when at outdoor.

處方醫師: 黃○○
 Physician HUANG, L. J.
 就診科別: 心臟內科上午 003
 Division Cardiology
 日期時間: 2004/05/10 1657
 Date & Time

處方天數: 30 天 day(s)
 Duration
 調劑藥師: 林藥師
 Pharmacist-1 Lin, M. Y.
 核對藥師: 周藥師
 Pharmacist-2 Chou, Y. C.

PS14

請核對姓名、藥袋總數、藥品名稱與外觀及數量; 並注意效期, 未標示者為一個月
 Please verify patient name, total bag number, drug name, appearance, and quantity.
 The expiration date is one month unless labeled on the package.

吃藥的時候

- 吃藥的方法
- 藥品要密封
- 藥品要放對地方




吃藥的方法

● 只能配白開水



● 要多喝水 藥才不會卡在
喉嚨裡



吃藥的方法



● 不要用咖啡、茶、果汁、
可樂、牛奶吃藥



吃藥以後

● 記得按時吃藥



● 不舒服要馬上通知醫生

