

登革熱簡介

登革熱俗稱天狗熱，又稱斷骨熱，是一種由埃及斑蚊和白線斑蚊傳播的急性病毒性熱病。登革熱的傳播病媒蚊—斑蚊，喜歡在白天活動叮咬人類。登革熱的潛伏期約3~8天，目前尚無有效的疫苗可供預防。登革病毒共有四型，重複感染不同型的登革病毒，可能引起登革出血熱，若不儘速就醫治療，死亡率可高達50%。

登革熱屬於「季節病」、「環境病」，北回歸線以南5縣市（高雄縣市、台南縣市、屏東縣）因有埃及斑蚊分布而飽受登革熱所苦。而高雄縣更身處高危險區五縣市的中心點，鄰近縣市若有登革熱疫情出現，因經商旅遊往來頻繁便造成疫情蔓延至本縣。另本縣氣溫悶熱多雨，年平均氣溫約25°C，年雨量則達1439.5mm，屬於適合埃及斑蚊生長的最佳生態環境。

清除病媒孳生源：戶內外容易積水之容器，如廢輪胎、空瓶、空罐…等要隨時清除，並將積水倒在乾燥地面上。

戶外空曠處容易積水的地方，如樹洞、竹洞、排水溝等都是病媒蚊孳生源，應徹底清除，並保持乾淨。水缸、花瓶、儲水池及其他盛水容器，每週最少要倒棄清洗一次，清洗時必須用刷子將內部用力刷洗，才能將病媒蚊的卵洗淨，防止病媒蚊孳生。

埃及斑蚊及白線斑蚊都在白天吸血，故白天應減少在戶外陰涼處活動，避免於樹蔭、草叢等處逗留，並儘量穿著淡色長袖衣褲以防蚊蟲叮咬。睡覺時掛蚊帳可以預防蚊蟲叮咬。若需噴灑滅蚊用藥，應選擇登記合格之殺蟲劑於家裡陰暗處噴灑，惟非必要時盡量不要使用殺

蟲劑。

你以為被蚊子叮咬

只是小事？別輕忽登革出血熱，若未及時就醫治療，死亡率可達50%

近年來高雄地區四型登革熱均曾流行，在交叉感染之下罹患登革出血熱機會將大幅提高，提醒市民朋友做好居家環境自我管理，杜絕登革熱。

「登革出血熱」症狀：

- 發燒
- 持續嘔吐
- 解黑便
- 牙齦出血
- 昏睡休克
- 其他可能症狀如：
皮膚出現紫斑、流鼻血、吐血、嚴重腹痛、躁動不安等



登革出血熱患者 (照片來源：行政院衛生署疾病管制局)



如何預防登革熱及注意事項：

- 每週定期主動清除詳加檢查家戶室內外可能積水的容器 (包括地下室、陰井、屋後溝及排水溝槽、不常用的馬桶、盆栽底盤、戶外輪胎、觀景池及頂樓廢棄物等)。
- 出入發生疫情地區應盡量穿著淡色長袖長褲，身體裸露部位塗抹防蚊藥品。
- 曾感染登革熱者，應避免至登革熱高風險區，以免遭病毒蚊叮咬而交叉感染登革出血熱。

* 民眾如有疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及近期活動史。建議停止上班上課，不要趴趴走。
* 若有登革出血熱症狀者，應立即至區域級以上醫院進行診治，以確保生命安全。

【高雄市政府衛生局 關心您 防疫專線：☎ 07-7230250】 廣告